



**クロツラ
ヘラサギ**
コウノトリ目
トキ科

生息区分	冬鳥
主な繁殖地	朝鮮半島北部、中国東部
主な餌	魚
全長	74cm

くちばしから目にかけての顔の部分が黒色。ヘラ状のくちばしを、水の中で左右に振って餌をとる。世界的に数が少なく、総個体数は約2000羽程度とされている。漫湖のシンボル的な水鳥。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



アオサギ
コウノトリ目
サギ科

生息区分	冬鳥(一部は夏もいる)
主な繁殖地	国内では九州以北
主な餌	魚
全長	93cm

サギの仲間では国内最大級の種で、体の上面は青みのある灰色で、下面是白色味をおびる。主に魚を餌とし、大きなテラピアを飲み込む姿を見ることもある。グワーーとしづがれた声で鳴く。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



ダイサギ
コウノトリ目
サギ科

生息区分	冬鳥(一部は夏もいる)
主な繁殖地	国内では関東以南
主な餌	魚
全長	90cm

シラサギの仲間では最大の種で、くちばしや首、脚が長い。眼下にある口角の切れ込みが目より後ろまで食べ込んでいるのが特徴。アゴーという鼻声のような声で鳴く。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



コサギ
コウノトリ目
サギ科

生息区分	冬鳥(少数が繁殖)
主な繁殖地	国内では本州以南
主な餌	小魚
全長	61cm

くちばしと脚は黒く、足指が黄色みを帯びるのが特徴。夏羽は後頭部に2本の細長い飾り羽、背には蓑笠上の飾り羽がある。グエー、グッパーという太い声で鳴く。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



ムナグロ
チドリ目
チドリ科

生息区分	旅鳥または冬鳥
主な繁殖地	シベリア北部
主な餌	ゴカイ、ヨコエビ、昆虫
全長	24cm

沖縄県内では最も普通に見られるチドリ類。「ターチジュヤー(田のチドリ)」や「ハルチジュヤー」などの方言名がある。ピューアイ、キヨビットと鳴く。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



**キアシ
シギ**
チドリ目
シギ科

生息区分	旅鳥(一部越冬)
主な繁殖地	シベリア東部
主な餌	カニ、ゴカイ、小魚
全長	25cm

その名の通り足が黄色いシギ。国内では普通に見られるシギだが、アメリカやヨーロッパなどでは見られない。漫湖には7月下旬から8月に最も多く飛来し、少数が越冬する。ピューアイ、ピューアイと鳴く。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



**アカシ
シギ**
チドリ目
シギ科

生息区分	旅鳥または冬鳥
主な繁殖地	ユーラシア大陸の中緯度地方
主な餌	ユスリカの幼虫(ボウフラ)
全長	28cm

赤い足が非常に目立つシギ。漫湖では、マングローブの間を歩き回っている姿を見ることができる。ピーチヨイチヨイ、ピョツピョツ、ピークと鳴く。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



**ダイシャク
シギ**
チドリ目
シギ科

生息区分	旅鳥または冬鳥
主な繁殖地	北欧から中央アジアの内陸部
主な餌	カニ
全長	60cm

長く下に曲がった特徴的なくちばしを持ち、シギの仲間では最大級の種。この長いくちばしを干潟に差し込んで餌となるカニを探る。カーリュー、ホーイ、ホーイと鳴く。

■ 漫湖で見られる時期(月)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12